



Impfungsplanung

Welche Impfungen?

- **PARAMYXO**

- o Alle Fliegtauben müssen geimpft werden. Diese Impfung ist 1 Jahr gültig.
- o Witwer: am besten im Oktober oder Januar oder während dem Brüten zu impfen.
- o Weibchen und Züchter: mindestens 3 x im Leben, aber am besten jährlich.
- o Jungtauben : ab dem Alter von 6 bis 8 Wochen.

- **POCKEN**

- o Kann mit dem Pinsel-Methode oder eine Injektion erfolgen.
- o Für Jährlingen und alte Tauben ist es am besten zusammen mit der Paramyxo zu tun.
- o Für Jungen: 2 Wochen nach der Inokulation gegen Paramyxo.

- **KOMBINATION IMPFSTOFF HERPES UND PARAMYXO**

- o Ist ein gutes Impfstoff zur Unterstützung der Herpes in Tauben.
- o Ich empfehle nur die Jungen zu impfen und dies möglicherweise während die Absetzung.

- **PARATHYFUS ODER SALMONELLEN IMPFSTOFF**

- o Wenn Salmonellen bei Ihren Tauben festgestellt wird, ist es am besten alle Ihre Tauben ein paar aufeinanderfolgenden Jahren gegen diese Krankheit zu impfen.
- o zum ersten Mal 2 x impfen mit 3 Wochen-Intervall, danach alle 6 Monate.

Meine jahrelange Erfahrung im racing Tauben haben mich gelehrt, dass je mehr man impft gegen bestimmte Krankheiten, je mehr Widerstand die Tauben haben gegen andere Krankheiten. Sie werden nicht so schnell krank.

WANN IMPFEN?

ZÜCHTER

- o Oktober : Paramyxo
- o Wenn Salmonellen Probleme auch gegen Salmonellen im Oktober und April

FÜR JÄHRLINGEN UND ALTE RACING TAUBEN

- o Paramyxo und Pocken zur gleichen Zeit im Oktober oder Januar
- o Salmonella: Februar

JUNGEN

- o 4-5 Wochen alt: Kombination Herpes & Paramyxo
- o 2 Wochen später Paramyxo
- o 2 Wochen später Pocken
- o 2 Wochen später Salmonellen bei Problemen

Raf Herbots

Attenhovenstraat 1 – 3806 Velm, Belgium

+32 475 246 589

www.herbovet.com