



IMPFUNGPLANUNG

Welche Impfungen?

- **PARAMYXO**

- o Alle Fliegtauben müssen geimpft sein. Diese Impfung ist 1 Jahr gültig.
- o Witwer: Impfung am besten im Oktober oder Januar oder während der Zucht.
- o Weibchen und Zuchthühner: Die Impfung gegen Paramyxio-Herpes erfolgt am besten 2 Wochen vor der Paarung.
- o Jungtauben ab dem Alter von 4–6 Wochen statt 6–8 Wochen.

- **POCKEN**

- o Kann mit dem Pinsel-Methode oder durch Injektion durchgeführt werden.
- o Für einjährige und alte Tauben gleichzeitig mit Paramyxio.
- o Bei Jungen 3 Wochen nach der Impfung gegen Rota Paramyxio.

- **KOMBINATIONSIMPFSTOFF HERPES UND PARAMYXO**

- o Ist ein guter Impfstoff zur Unterstützung von Herpes bei Tauben.

- **PARATHYPHUS- ODER SALMONELLA-IMPFSSTOFF**

- o Wenn Salmonellen diagnostiziert wurden, lassen Sie Ihre Tauben am besten einige Jahre hintereinander und alle 6 Monate gegen Salmonellen impfen.

WANN IMPFEN?

ZÜCHTER

- o Oktober: 2 Wochen vor der Paarung gegen Paramyxio-Herpes
- o Bei Salmonellenproblemen zusätzlich 4 Wochen vor der Anpaarung und 6 Monate danach eine Salmonellenimpfung durchführen.

FÜR JÄHRLINGEN UND ALTE RACING TAUBEN

- o Paramyxio und Pocken gleichzeitig im Oktober oder Januar
- o Salmonellen: Februar

JUNGEN

- o 4 Wochen alt: Rota Paramyxio
- o 3 später: Rota Paramyxio
- o 3 Wochen später Pocken
- o 3 Wochen später Salmonellen bei Problemen

Raf & Kobe Herbots
Attenhovenstraat 1 - 3806 Velm, Belgium
Place de l'hôtel de Ville 18a - 7160 Chapelle-lez-Herlaimont
+32 475 246 589
+32 495 246 613

herbovet.com
hbv-shop.herbovet.com