



IMPFUNGSPLAN

WELCHE IMPFUNGEN?

PARAMYXO

- o Alle Reisetauben müssen geimpft sein. Diese Impfung ist 1 Jahr lang gültig.
- o Witwer: Impfung am besten im Oktober oder Januar.
- o Zuchttauben: die Impfung gegen Paramyxo-Herpes erfolgt am besten 2 Wochen vor der Paarung.

POCKEN

- o Kann mit dem Pinsel-Methode oder durch Injektion durchgeführt werden.
- o Für jährige und alte Tauben gleichzeitig mit Paramyxo.
- o Bei Jungen 3 Wochen nach der Impfung gegen Rota Paramyxo.

KOMBINATIONSIMPFSTOFF HERPES UND PARAMYXO

Ist ein guter Impfstoff zur Unterstützung von Herpes bei Tauben.

PARATHYPHUS- ODER SALMONELLA-IMPFSTOFF

Wenn Salmonellen diagnostiziert wurden, lassen Sie Ihre Tauben am besten einige Jahre hintereinander und alle 6 Monate gegen Salmonellen impfen.

WANN IMPFEN?

ZÜCHTTAUBEN

- o Oktober: 2 Wochen vor der Paarung gegen Paramyxo-Herpes
- o Bei Salmonellenproblemen zusätzlich 6 Wochen vor der Anpaarung und 6 Monate danach eine Salmonellenimpfung durchführen.

JUNGEN

- o 4 Wochen alt: Rota Paramyxo
- o 3 Wochen später: Rota Paramyxo
- o 3 Wochen später Pocken
- o 3 Wochen später Salmonellen bei Problemen

Raf & Kobe Herbots
Attenhovenstraat 1 - 3806 Velm, Belgium
Place de l'hôtel de Ville 18a - 7160 Chapelle-lez-Herlaimont
+32 475 246 589
+32 495 246 613

herbovet.com
hbv-shop.herbovet.com