



Schéma de la vaccination

Quels vaccins?

- **PARAMYXO**

- o Tous les pigeons voyageurs doivent être vaccinés. Cette vaccination est valable 1 an.
- o Veufs : mieux vaut vacciner en octobre ou janvier ou pendant la reproduction.
- o Poules et reproductrices : il est préférable de vacciner contre l'herpès Paramyxio 2 semaines avant l'accouplement.
- o Garçon : dès l'âge de 4-6 semaines au lieu de 6 à 8 semaines.

- **VARIOLE**

- o Peut être réalisé avec la méthode au pinceau ou par injection.
- o Pour les pigeons d'un an et les vieux pigeons en même temps que Paramyxio.
- o Chez les garçons 3 semaines après la vaccination contre Rota Paramyxio.

- **VACCIN COMBINÉ CONTRE L'HERPÈS ET LE PARAMYXO**

- o Est-ce un bon vaccin pour lutter contre l'herpès chez les pigeons.

- **VACCIN PARATHYPHUS OU SALMONELLA**

- o Si une salmonelle a été diagnostiquée, il est préférable de faire vacciner vos pigeons contre la salmonelle quelques années de suite et tous les 6 mois.

QUAND VACCINER?

ÉLEVEURS

- o Octobre : 2 semaines avant l'appariement contre l'herpès Paramyxio
- o S'il y a des problèmes de salmonelles, vacciner également contre les salmonelles 4 semaines avant l'accouplement et 6 mois plus tard.

PIGEONS D'UN AN ET VIEUX PIGEONS VOLANTS

- o Paramyxio et variole en même temps en octobre ou janvier
- o Salmonelles : février

JEUNES

- o 4-5 semaines vieux : combinaison Herpes & Paramyxio
- o 2 semaines plus tard Paramyxio
- o 2 semaines plus tard la variole
- o 2 semaines plus tard Salmonella s'il y a un problème