



Schéma de vaccination

Quels vaccins?

PARAMYXO

- Tous les pigeons voyageurs doivent être vaccinés. Cette vaccination est valable 1 an.
- Veufs : mieux vaut vacciner en octobre ou janvier ou pendant la reproduction.
- Reproducteurs : il est préférable de vacciner contre l'herpès Paramyxo 2 semaines avant l'accouplement.

VARIOLE

- Peut être réalisé avec la méthode au pinceau ou par injection.
- Pour les pigeons d'un an et les vieux pigeons en même temps que Paramyxo.
- Chez les jeunes 3 semaines après la vaccination contre Rota Paramyxo.

VACCIN PARATHYPHUS OU SALMONELLA

- Si une salmonelle a été diagnostiquée, il est préférable de faire vacciner vos pigeons contre la salmonelle quelques années de suite et tous les 6 mois.

QUAND VACCINER?

ÉLEVEURS

- Octobre : 2 semaines avant accoupler contre l'herpès Paramyxo
- S'il y a des problèmes de salmonelles, vacciner également contre les salmonelles 4 semaines avant l'accouplement et 6 mois plus tard.

LES VOYAGEURS JEUNES

Au sévrage rota Paramyxo

- 3 semaines plus tard rota paramyxo
- 3 semaines plus tard la variole
- 3 semaines plus tard quand vous avez des problèmes de salmonella vaccin salmonella

Raf & Kobe Herbots
Attenhovenstraat 1 - 3806 Velm, Belgium
Place de l'hôtel de Ville 18a - 7160 Chapelle-lez-Herlaimont
+32 475 246 589
+32 495 246 613

herbovet.com
hbv-shop.herbovet.com