



IMPFPLAN

WELCHE IMPFUNGEN?

PARAMYXO

Alle Flugtauben müssen geimpft werden. Diese Impfung ist 1 Jahr lang gültig.

Witwer: Am besten im Oktober oder Januar oder während der Brutzeit impfen.

Weibchen und Züchter: Am besten 2 Wochen vor der Paarung gegen Herpes Paramyxio impfen.

Jungtauben: ab einem Alter von 4-6 Wochen.

POCKEN

o Kann mit der Bürstenmethode oder durch Injektion durchgeführt werden.

o Bei Jährigen und Alten am besten gleichzeitig mit Paramyxio.

o Bei Jungtauben 3 Wochen nach der Impfung gegen Rota Paramyxio.

KOMBINATIONSVAKZINE HERPES UND PARAMYXO

o Ist ein gutes Vakzin gegen Herpes bei Tauben.

PARATHYFUS- ODER SALMONELLEN-VAKZIN

o Wenn Salmonellen festgestellt wurden, lassen Sie Ihre Tauben am besten einige Jahre hintereinander alle 6 Monate gegen Salmonellen impfen.

WANN SOLLTE GEIMPFT WERDEN?

ZUCHTER

November: 2 Wochen vor der Paarung gegen Herpes Paramyxio.

Bei Salmonellenproblemen auch gegen Salmonellen impfen, 5-6 Wochen vor der Paarung und 6 Monate später.

JAHRESTAUBEN UND ALTE FLIEGETAUBEN

Paramyxio und Pocken gleichzeitig im Oktober oder Januar.

Salmonellen: Februar.

JUNGTAUBEN

4 Wochen alt: Rota Paramyxio.

3 Wochen später: Rota Paramyxio.

3 Wochen später: Pocken.

3 Wochen später: Salmonellen, wenn Probleme auftreten.

Raf & Kobe Herbots

Attenhovenstraat 1 - 3806 Velm, Belgium

Place de l'hôtel de Ville 18a - 7160 Chapelle-lez-Herlaimont

+32 475 246 589

+32 495 246 613

herbovet.com

hbv-shop.herbovet.com